

## **FI** Käyttötarkoitus

Gelsectan on tarkoitettu suoliston toiminnan palauttamiseen niillä potilailla, joilla on ärtyvän suolen oireyhtymän (Irritable Bowel Syndrome, IBS) aiheuttamia muutoksia, tai joilla on suolistoyliherkkyyttä, tai suolisto-oireita tiettyjen lääkkeiden ottamisen jälkeen. Gelsectan lievittää ja estää kroonisen tai uusiutuvan ripulin, vatsan alueen jännittyneisyyden, kivun, turvotuksen ja ilmavaivojen kaltaisia oireita.

## **Pakkaus**

60 kapselin läpipainopakkaus. Yli 18-vuotiaille.

## **Koostumus**

Ksyloglykaani (Tamarindus indica L), herneproteiini (Pisum sativum L) ja viinirypäleensiemenuute (Vitis Vinifera L), ksylo-oligosakkaridit (Zea mais L), magnesiumstearaatti (kasvisperäinen) ja amorfinen saostunut piidioksidi.

## **Käyttöohjeet**

Niele kapseli nesteen kera.

## **Annostus**

1 tai 2 kapselia oireiden vakavuuden mukaan kahdesti vuorokaudessa (aamulla ennen aamiaista ja illalla ennen illallista) 2–4 viikon ajan. Hoitoa voidaan tarvittaessa käyttää ylläpitohoitona.

## **Varoitukset**

- Keskusteleminen terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen tuotteen käyttöä ei ole välttämätöntä. Se on kuitenkin suositeltavaa, jos oireet ovat vaikeita tai jatkuvia tai jos diagnoosi on epävarma, etenkin iäkkäiden potilaiden tapauksessa.
- Tämä terveydenhuollon laite ei ole lääkehoito. Jos terveydenhuollon ammattilainen suosittelee lääkehoitoa, sitä voidaan käyttää samanaikaisesti tämän valmisteen kanssa.
- Vaikka sivuvaikutuksia ei tunneta, on suositeltavaa pidättäytyä käyttämästä valmistetta raskauden aikana tai imetyksen alkukuukausina, ellei terveydenhuollon ammattilainen toisin neuvo.
- Valmistetta ei saa käyttää pakkaukseen merkityn viimeisen käyttöpäivän jälkeen.
- Valmistetta ei saa käyttää, jos läpipainopakkaus on avattu tai vahingoittunut.

## **Säilytys**

Säilytä huoneenlämmössä 5-25°C:n lämpötilassa. Pidä valmiste lasten ulottumattomissa.

## **Vasta-aiheet**

Gelsectania ei saa käyttää potilailla, joilla on tunnettu yliherkkyys ksyloglykaanille tai tuotteen mille tahansa muulle Koostumus-kohdassa ilmoitetulle ainesosalle.

**Gelsectan on EU:ssa hyväksytty itsehoitoon tarkoitettu lääkinnällinen laite.**

## **SE** Avsedd användning

Gelsectan är avsett att återställa tarmfunktion hos de patienter som lider av förändringar till följd av känslig darm (Irritable Bowel Syndrome IBS), intestinal överkänslighet eller efter intag av vissa läkemedel för att lindra och förhindra symtom såsom kronisk eller recidiverande diarré, bukspänning, smärta, uppsvälldhet och väderspänningar.

## **Förpackning**

Blisterförpackning som innehåller 60 kapslar. Kan användas från 18 år.

## **Sammansättning**

Xyloglykan (Tamarindus indica L), ärtprotein (Pisum sativum L) och druvkärnsextrakt (Vitis Vinifera L), xylo-oligosackarider (Zea mais L), magnesiumstearat (vegetabiliskt ursprung) och amorf utfäld kiseldioxid.

## **Bruksanvisning**

Svälj kapseln med vätska.

Markkinoija / Marknadsförare:  
Sabora Pharma Oy  
www.sabora.fi  
P: 029 3700 350

Distributør Danmark:  
Pharmaforce ApS  
www.pharmaforce.dk  
Tlf. 70 27 27 47



Valmistaja / Tillverkare:  
Devintec SAGL  
Via Berna 9  
6900 Lugano – Switzerland



**Dosering**

1 eller 2 kapsler, beroende på symtoms svårighetsgrad, två gånger per dag (på morgonen före frukost och på kvällen före middag) under 2 till 4 veckor. Behandlingen kan fortsättas om så behövs.

**Varningar**

- Sjukvårdspersonal behöver inte rådfrågas före användning av produkten. Rådfrågning är dock tillrådlig vid allvarliga eller ihållande symtom eller när det finns tvivel gällande diagnos, huvudsakligen hos äldre personer.
- Denna medicintekniska produkt är inte en farmakologisk behandling. Om sådan behandling rekommenderas av sjukvårdspersonal kan läkemedlet administreras samtidigt med denna.
- Även om inga biverkningar är kända, rekommenderas att produkten inte används under graviditet eller under de första månadernas amning, om inte annat anges av sjukvårdspersonal.
- Använd inte produkten efter utgångsdatum som anges på förpackningen.
- Använd inte produkten om blisterförpackningen är öppnad eller skadad.

**Förvaring**

Förvaras i rumstemperatur (5-25°C). Förvaras utom räckhåll för barn.

**Kontraindikationer**

Gelsectan ska inte användas till patienter med känd överkänslighet mot xyloglukan eller något annat innehållsämne i produkten som anges i Sammansättningen.

**Gelsectan är godkänd i EU som medicinteknisk produkt för egenvård.**

** Användelse**

Gelsectan har til formål at genoprette tarmfunktionen hos patienter med symptomer relateret til Irritabel tarmsyndrom (Irritable Bowel Syndrome, IBS). Gelsectan kan også anvendes til hypersensitiv tarm eller efter indtagelse af visse medikamenter, til at lindre og forebygge symptomer som kronisk eller tilbagevendende diarré, abdominal spænding, smerte, oppustethed og flatulens.

**Pakning**

Blisterpakning, indeholder 60 kapsler. Kan anvendes fra 18 år.

**Ingredienser**

Xyloglucan (Tamarindus indica L), Pea Protein (Pisum sativum L), Grape Seed Extract (Vitis Vinifera L), Xylo-oligosaccharides (Zea mais L), Magnesium Stearate (vegetabilisk), Amorphous Precipitated Silica.

**Brugsanvisning**

Slug kapslen med væske.

**Dosering**

1 eller 2 kapsler, afhængigt af symptomernes sværhedsgrad, to gange om dagen (morgen og aften før mad) i 2 til 4 uger. Behandlingen kan fortsættes så længe det skønnes nødvendigt.

**Advarsler**

- Kontakt din læge i tilfælde af alvorlige eller vedvarende symptomer, eller hvis du er i tvivl.
- Der er ingen kendte interaktioner med Gelsectan, ift. andre produkter mod f.eks. oppustethed eller anden medicin, hvis produktet anvendes som foreskrevet.
- Der er ingen kendte bivirkninger, dog anbefales det, at produktet ikke anvendes under graviditet eller i de første måneder af ammeperioden, medmindre andet er aftalt med læge eller sygeplejerske
- Produktet må ikke anvendes efter den udløbsdato, som er angivet på pakningen.
- Brug ikke dette produkt, hvis blisterpakningen er åbnet eller beskadiget.

**Opbevaring**

Kapslerne opbevares ved stuetemperatur, dog min. 5°C og max. 25°C. Opbevares utilgængeligt for børn.

**Kontraindikationer**

Anvend ikke Gelsectan kapslerne, hvis du er allergisk over for nogle af indholdsstofferne. Se ingrediensliste.

**Gelsectan kapslerne er godkendt i EU som Medicinsk udstyr til selvbehandling.**



Markkinoija / Marknadsförare:  
Sabora Pharma Oy  
www.sabora.fi  
P: 029 3700 350

Distributør Danmark:  
Pharmaforce ApS  
www.pharmaforce.dk  
Tlf. 70 27 27 47



Valmistaja / Tillverkare:  
Devintec SAGL  
Via Berna 9  
6900 Lugano – Switzerland